

СЛИШКОМ МНОГО – ЭТО СКОЛЬКО?

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
РЕКОМЕНДУЕТ ИСХОДИТЬ ИЗ СТАНДАРТНОЙ ДОЗЫ (СД)

СТАНДАРТНАЯ ДОЗА АЛКОГОЛЯ (СД)

Это такое количество алкогольного напитка, в котором содержится этиловый алкоголь в количестве эквивалентном 10 г чистого спирта^{3,4}

 50 мл крепкого напитка (водка, коньяк, виски) 40% об. – 1,6 СД	 200 мл крепкого напитка (водка, коньяк, виски) 40% об. – 6,3 СД	 500 мл крепкого напитка (водка, коньяк, виски) 40% об. – 15,7 СД
 150 мл шампанского 11% об. – 1,3 СД	 100 мл сухого вина 13% об. – 1,0 СД	 750 мл сухого вина 13% об. – 7,7 СД
 150 мл барного коктейля средней крепости 18% об. – 2,1 СД	 100 мл креплённого вина 18% об. – 1,4 СД	 750 мл креплённого вина 18% об. – 10,6 СД
 330 мл лёгкого пива 4,5% об. – 1,2 СД	 500 мл лёгкого пива 4,5% об. – 1,8 СД	 500 мл крепкого пива, коктейля в банке 8% об. – 3,1 СД

Как посчитать потребление алкоголя за неделю?

$$\frac{\text{стандартных доз в напитке}}{\text{х выпивается в день}} \times \frac{\text{выпивается в день}}{\text{х выпивается дней в неделю}} = \text{потребление за неделю}$$

Например:

$$\frac{1,8 \text{ СД}}{\text{бутылка пива 500 мл}} \times \frac{3 \text{ бутылки в день}}{\text{стандартных доз в напитке}} \times \frac{5 \text{ дней в неделю}}{\text{выпивается в день}} = \frac{27 \text{ СД в неделю}}{\text{выпивается дней в неделю}} = \text{потребление за неделю}$$

Употребление алкоголя с низким риском для здоровья¹



для мужчин
≤3-4 доз в день или
≤21 дозы в неделю



для женщин
≤2-3 доз в день или
≤14 доз в неделю

Три уровня риска для здоровья при потреблении алкоголя, ВОЗ²



* Для расчета стандартных доз используйте следующую формулу: объем тары (литры) x объемный % этилового спирта (мл/100 мл) x 0,789 = количество стандартных доз.

1 NHS 2007, www.dh.gov.uk/publications; 2 WHO. International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm 2000. Page 54. 3 International Center for Alcohol Policies (ICAP). The ICAP Blue Book, Module 20: Standard Drinks. Page 6; 4Anderson et al. 2005. Alcohol and Primary Health Care: Clinical Guidelines on Identification and Brief Interventions. Page 19; 5European Medicines Agency (EMEA) (2010): Guideline on the development of medicinal products for the treatment of alcohol dependence. EMEA/CHMP/EWP/20097/2008.